

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE" (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

Sous-Régie de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS
C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL
25 Francs

DLPI4-8-68 825781

Supplément N° 2 au Bulletin N° 95

13 AOÛT 1968

- 33 -

AVERTISSEMENTS -

MILDIOU DE LA VIGNE

VIGNES

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à la maladie. Dans la plupart des régions, le traitement conseillé dans notre bulletin du 5 Août a été lessivé par les pluies orageuses fréquentes et localement très abondantes.

De nouvelles taches sont apparues dans de nombreuses vignes.

En conséquence, un nouveau traitement est nécessaire. Ce traitement devra être exécuté dès que possible, dans toutes les vignes où les manifestations de la maladie sont nombreuses ; il pourra être reculé jusqu'au début de la semaine prochaine dans toutes les situations où l'état sanitaire est satisfaisant ; il devra être complété par un poudrage cuprique dans tous les cas où des attaques de Rot-brun ont été observées.

Les produits à base de cuivre où les organo-cupriques sont à préférer pour ces traitements de fin de saison.

BLACK-ROT DE LA VIGNE

Les conditions climatiques sont également favorables au Black-Rot. Le traitement dirigé contre le Mildiou sera également efficace contre cette maladie. Nous rappelons que la lutte contre le Black-Rot est obligatoire dans toutes les communes déclarées contaminées par arrêté préfectoral.

VERS DE LA GRAPPE

Il y a lieu d'exécuter de toute urgence le traitement conseillé par nos Bulletins du 29 Juillet et du 5 Août dans les vignes où la présence de chenilles aura été décelée.

La lutte contre les Vers de la grappe est d'autant plus nécessaire que les conditions climatiques actuelles sont favorables au développement de la Pourriture grise dont les premières manifestations sont déjà observées dans certains vignobles.

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

ARBRES FRUITIERS

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables au développement de ces maladies. Des attaques très préjudiciables à la récolte sont à craindre sur les pommes et les poires tardives, notamment la Passe Crassanne.

Nous ne pouvons que rappeler les termes de notre Bulletin du 17 Juin. Une protection permanente est nécessaire jusqu'à la récolte et les traitements devront être renouvelés en fonction de leur lessivage par les pluies et du grossissement des fruits.

Le traitement conseillé dans notre Bulletin du 5 Août a été pratiquement lessivé par les pluies. Il est donc nécessaire d'assurer le plus rapidement possible une nouvelle protection des fruits.

P. 42

.../...

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le deuxième vol est commencé depuis quelques jours. Toutefois les conditions climatiques actuelles ne sont pas très favorables à une activité importante du ravageur.

L'adjonction, à la bouillie destinée à combattre les Tavelures, d'un insecticide efficace contre le Carpocapse n'est donc nécessaire que dans les situations très favorables à ce ravageur où la dernière application a été lessivée par les pluies de ces derniers jours.

POMME DE TERRE

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Les conditions climatiques actuelles favorisent une extension très rapide de la maladie. Dans toutes les cultures où la tubérisation est terminée il y a lieu d'effectuer très rapidement un défanage qui évitera des contaminations sur tubercules.

Dans les cultures plus tardives où la maladie n'a pas été observée une nouvelle application est conseillée. Toutefois, la destruction des fanes s'imposera dans ces cultures dès l'apparition des premières taches.

INFORMATIONS -

MILDIOU DE LA TOMATE

CULTURES LEGUMIERES

Nous rappelons les termes de notre bulletin du 23 Juillet. Les conditions climatiques étant très favorables à la maladie il y a lieu de maintenir la protection avec l'un des produits conseillés contre le Mildiou de la Pomme de terre.

Tant que les conditions climatiques actuelles persisteront les traitements seront à renouveler en fonction des pluies ou des arrosages.

SEPTORIOSE DU CELERI

Les manifestations de la maladie sont très nombreuses dans les cultures insuffisamment protégées. Nous rappelons que la protection des cultures doit être poursuivie régulièrement, en tenant compte des lessivages par les pluies ou les arrosages, en utilisant un des produits conseillés dans notre bulletin du 17 Juin.

TEIGNE DU POIREAU

On observe une certaine activité de ce ravageur. Des pontes ont été déposées et les premières éclosions sont à prévoir durant les prochains jours.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un traitement soit par trempage des plants, soit par pulvérisation sur les cultures en place, en utilisant un des produits suivants : PARATHION-ETHYL (25 g de M.A. Hectolitre), PARATHION-METHYL (40 g de M.A. Hl), DIAZINON (25 g M.A. Hl), MALATHION (75 g de M.A. Hl), LINDANE (30 g de M.A. Hl), D.D.T. (100 g de M.A. Hl).

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles,

G. RIBAUT
B. PACQUETEAU

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,

G. BENAS